CANAL DE WHATSAPP

CANAL DE YOUTUBE

Plaza del Canal Imperial
de Aragón, nº 2
50007 - ZARAGOZA

976 730 484
administracion@farcaza.es

www.farcaza.es

Federación Aragonesa de Caza

I FORO NACIONAL

LA ENFERMEDAD DE AUJESZKY EN PERROS DE CAZA



AUJESZKY


EN PERROS DE CAZA/REHALAS

El aujezsky es una **enfermedad infectocontagiosa causada por un herpesvirus** que puede afectar a múltiples especies animales.

ANIMALES A LOS QUE AFECTA

Principalmente afecta a **cerdos y jabalíes,** que actúan como hospedadores y reservorios naturales del virus.

En los **perros**, la enfermedad se manifiesta con síntomas clínicos graves.



TRANSMISIÓN DEL VIRUS

Los **jabalíes** se infectan a través del contacto con otros jabalíes enfermos.

Los **perros**, en cambio, pueden contagiarse por contacto directo con jabalíes infectados, especialmente a través de mordeduras y del consumo de carne cruda o vísceras de estos animales durante la caza.

ACTUACIÓN DEL VIRUS

El virus puede permanecer en un **estado latente en los cerdos y jabalíes** hasta que un factor de estrés en el animal desencadena nuevamente su replicación, volviéndose infeccioso para otros animales que conviven con él.

Los perros de rehala son particularmente susceptibles a la infección.



SÍNTOMAS EN PERROS

El periodo de incubación es de 2 a 6 días, y los síntomas incluyen vómitos, diarrea, falta de apetito, dificultad para respirar, nerviosismo, picazón intensa y compulsiva, aullidos, alteraciones del comportamiento y síntomas neurológicos, entre otros.

Síntoma característico:

Prurito o picor repentino y muy intenso, imposible de controlar, localizado en el sitio de entrada del virus, generalmente en un lado de la cara.



RECOMENDACIONES

Evitar acceso de los perros a carne y vísceras de jabalíes.

Una medida importante de prevención de la infección consiste en **minimizar**, cuando sea posible, **el contacto directo de los perros con los jabalíes heridos o muertos y evitar el acceso de los perros al consumo de carne y vísceras** de jabalíes, aunque parezcan sanos, ya que en el jabalí la infección suele cursar de forma asintomática. Para ello, es recomendable que durante la cacería se intente vigilar que los perros no coman de las piezas cazadas y, de igual modo, se recomienda no dar restos de esta carne u órganos a los animales durante el despiece de la canal.

En caso de destinar carne o vísceras de jabalí para la alimentación de los perros, es necesario su tratamiento térmico previo (cocinado o guisado).

Concienciación sobre los síntomas y lesiones, y sobre las acciones a seguir en caso de sospecha. Los propietarios de los canes y/o los veterinarios clínicos deben **comunicar a los veterinarios de las OCAs los casos sospechosos para su diagnóstico oficial.**

Si eres cazador federado en Aragón y sospechas que tus perros pueden estar afectados puedes ponerte en contacto con los servicios técnicos de la federación:
tecnico@farcaza.es

Más información aquí